

Algebra 2 Reference Sheet

Quadratic Functions

Standard Form: $y = ax^2 + bx + c$

Axis of symmetry: $\frac{-b}{2a}$

Vertex Form: $y = a(x - h)^2 + k$

Vertex: (h, k)

Axis of symmetry: $x = h$

Quadratic Formula when $ax^2 + bx + c = 0$
 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Properties of Logarithms

Product Property: $\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$

Quotient Property: $\log_b\frac{x}{y} = \log_b x - \log_b y$

Power Property: $\log_b(x^r) = r \log_b x$

Special Properties

$\log_b 1 = 0$ because $b^0 = 1$

$\log_b b = 1$ because $b^1 = b$

$\log_b b^x = x$ and $b^{\log_b x} = x$

Complex Number

$a + bi$ where a and b are real numbers and $i = \sqrt{-1}$

Composition of Functions

$(f \circ g)x = f(g(x))$

$(g \circ f)x = g(f(x))$

Exponential Function

$y = a(b)^x$, $a \neq 0$, $b > 0$, $b \neq 1$

Definition of Logarithmic Function

$\log_a x = y$ is the same as $x = a^y$

Change of Base Rule

$\log_a x = \frac{\log x}{\log a}$ $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$

Sine and Cosine Functions

$y = a \sin b(x - h) + k$

Amplitude = $|a|$

Period = $\frac{2\pi}{|b|}$

$\sin \theta = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}}$


$\cos \theta = \frac{\text{adj}}{\text{hyp}}$

$\tan \theta = \frac{\text{opp}}{\text{adj}}$

Vertical Shift = k

degree to radians multiply by $\left(\frac{\pi \cdot \text{radians}}{180}\right)$

Unit Circle




Circle

θ in radians

Combination

$${}_n C_r = C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Arc Length: $s = r\theta$



Area of a Sector: $A = \frac{1}{2}r^2\theta$

Álgebra 2

Hoja de Referencia

Funciones Cuadráticas

Forma Estándar: $y = ax^2 + bx + c$

Eje de Simetría: $\frac{-b}{2a}$

Formula de Vértice: $y = a(x - h)^2 + k$

Vértice: (h, k)

Eje de Simetría: $x = h$

Formula Cuadrática cuando $ax^2 + bx + c = 0$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Número Complejo

$a + bi$ donde a y b son números reales y $i = \sqrt{-1}$

Composición de Funciones

$$(f \circ g)x = f(g(x))$$

$$(g \circ f)x = g(f(x))$$

Funciones Exponenciales

$y = a(b)^x$, $a \neq 0$, $b > 0$, $b \neq 1$

Definición de Función Logarítmica

$\log_a x = y$ es lo mismo que $x = a^y$

Regla de Cambio de Base

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a} \quad \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

Propiedades de Logaritmos

Propiedad de Producto: $\log_b xy = \log_b x + \log_b y$

Propiedad de Cociente: $\log_b \frac{x}{y} = \log_b x - \log_b y$

Propiedad de Poder: $\log_b x^r = r \log_b x$

Propiedades Especiales

$\log_b 1 = 0$ porque $b^0 = 1$

$\log_b b = 1$ porque $b^1 = b$

$\log_b b^x = x$

$b^{\log_b x} = x$

Exponentes

$$a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p} = (\sqrt[q]{a})^p$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n$$


Factoriales

$$n! = n(n-1)(n-2) \dots \dots 3 \cdot 2 \cdot 1$$

Círculo Unidad

Círculo

θ en radianes



Longitud de Arco: $s = r\theta$

Área de un sector: $A = \frac{1}{2}r^2\theta$

Funciones de Seno y Coseno

Propiedad de Producto: $y = a \cos b(x - h) + k$

Amplitud = $|a|$

Cambio de Fase = h

Periodo de una función = $\frac{2\pi}{|b|}$

Cambio vertical = k

$\sin \theta = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}}$

$\cos \theta = \frac{\text{adj}}{\text{hyp}}$

$\tan \theta = \frac{\text{opp}}{\text{adj}}$

Para convertir de Grados a Radianes multiplicar por $\frac{\pi \bullet \text{radianes}}{180}$

Para convertir de Radianes a Grados multiplicar por $\frac{180}{\pi \bullet \text{radianes}}$